

# Objectifs



- Primaire :
  - Mesure des connaissances des traitements immunosuppresseurs du patient greffé
  - étude de l'impact de cette intervention sur la compréhension des patients transplantés rénaux
- Secondaire:
  - Favoriser l'observance des patients

# Methodologie



- Patients récemment transplantés au CHRU Clémenceau: 01/08 à aujourd'hui.
- Deux groupes:
  - Groupe suivi : patients bénéficiant d'un suivi de leurs connaissances par leur pharmacien d'officine.
  - Groupe témoins: constitué de patients ne bénéficiant pas de ce suivi.
- En quoi consiste ce suivi ?
  - Lors de sa visite chez le pharmacien , un auto-questionnaire relatif à son traitement immunosuppresseur sera remis au patient .
  - Le pharmacien reverra ensuite l'ensemble des questions et des réponses avec le patient afin de vérifier sa compréhension et de le corriger
  - Ce questionnaire sera fait à 3 mois (M3), à 6 mois (M6) et à 12 mois

## Déroulement (2)



- Le groupe témoin se verra remettre le même questionnaire à M1, M6 et M12 mais les réponses ne donneront lieu à aucune intervention.

<b>NOM :</b>	<b>Date de naissance :</b>
<b>Prénom :</b>	<b>Date de greffe :</b>
<b>Sexe :</b>	<b>Date du jour :</b>

- Aujourd'hui, venez-vous :
  - Seul
  - Accompagné de votre conjoint(e)
  - accompagné d'une autre personne (parents, amis...)
- En général, qui prépare vos médicaments avant que vous les preniez ?
  - Vous même
  - Votre conjoint(e) ou autre membre de votre famille
  - Une infirmière



1) Pouvez-vous citer vos traitements anti-rejets ?

2) A quelles heures et dans quelles conditions alimentaires (repas) prenez vous ce traitement ?

	Dose par jour	Heures			Repas			
		Matin	Midi	Soir	Avant	Pendant	Après	A distance
NEORAL (ciclosporine)		..h..	..h..	..h..				
PROGRAF (tacrolimus)		..h..	..h..	..h..				
ADVAGRAF (tacrolimus LP)		..h..	..h..	..h..				
RAPAMUNE (sirolimus)		..h..	..h..	..h..				
IMUREL (azathioprine)		..h..	..h..	..h..				
CELLCEPT (mycophénolate mofétil) ou MYFORTIC (acide mycophénolique)		..h..	..h..	..h..				
CORTANCYL (glucocorticoïdes)		..h..	..h..	..h..				

3) Pouvez-vous boire du jus de pamplemousse ?  OUI  NON

4) a. Selon vous, l'oubli d'une prise de l'un de vos médicaments anti-rejets a-t-il de l'importance même si c'est exceptionnel ?  OUI  NON

b. Savez-vous que faire en cas d'oubli ?  OUI  NON

c. Si oui, que fait vous en cas d'oubli?



- Rien, vous attendez la prise suivante
- Vous doublez la dose à la prochaine prise
- Vous prenez la dose oublié si l'oubli date de moins de 6h
- Vous prenez la dose oublié si l'oubli date de plus de 6h

5) a. Votre traitement a-t-il été modifié récemment ?  OUI  NON

b. Si oui savez-vous pourquoi ?  OUI  NON

6) Estimez-vous avoir été suffisamment informé par le néphrologue, sur les médicaments que vous prenez ?  Très satisfait  Satisfait  Moyennement satisfait  Insatisfait

7) Pensez-vous que l'entretien avec votre pharmacien vous a permis de mieux comprendre votre traitement anti-rejet ?  OUI  NON





# Analyse des résultats

- Un score sera établie à chaque visite ( M1, M3, M6 ) pour évaluer la compréhension du patient
  - Dans le questionnaire, chaque bonne réponse donnera 1 point. La somme des point obtenus permettra de dresser un score (score max =12).
- Mise en évidence ou non d'une évolution dans la compréhension du traitement.
  
- Analyse des scores à M1 et M6 du groupe témoins.
- Mise en évidence ou non d'une différence significative en les 2 groupes.
- Questionnaire à M12 pour les personnes suivies et mise en évidence ou non d'une différence significative avec M1 et M6 afin d'évaluer
  - une perte des connaissance acquises avec le temps
  - une annulation des effets avec le temps
  - un maintien des connaissance acquises